

## Empfindlichkeit von Birnensorten auf Neem

Neem kann auf den Birnenblättern und/oder -Früchten gewisser Sorten unterschiedlich starke Schäden anrichten. Auf Grund verschiedener Informationsquellen (FiBL, Erhebungen innerhalb Sortenprüfungen im Interreg-Programm; Arbobio, Andermatt Biocontrol) wurde in der Tabelle eine Einschätzung der Empfindlichkeit zusammengestellt. Die Tabelle ist provisorisch; die Autoren übernehmen keine Verantwortung für allfällige Schäden infolge von Neembehandlungen, die auf diesen Informationen basieren.

Birnensorte	Empfindlichkeit auf Neem		Zuverlässigkeit der Information
	Blätter	Früchte	
Abate	1	1	A
Alexander Lukas	3	3	A
Angélis	3	2	A
Beurré Hardy	1	1	A
Bosc	1	1	A
Bristol Cross	3	3	A
Comice	3	3	A
Concorde	1	1	B
Condo	1	1	B
Conférence	3	3	A
Delacomis	3	1	B
Duchesse Bérerd	3	3	A
Elliot	2	1	B
Giffard	1	1	A
Guyot	3	3	A
Harrow Sweet	1	1	A
Hortensia	1	1	B
HW 606	3	3	A
Illinois 13	3	3	A
Lectier	3	3	A
Gute Luise	1	1	A
Marguerite Marillat	3	3	A
Morettini	3	3	A
Packham's	1	1	A
Pierre Corneille	3	3	A
Roksolana	3	3	B
Trévoux	3	3	A
Uta	1	1	A
Williams	1	1	A
Winterdechant	3	3	A
Xenia	1	1	B

Interpretationsschlüssel: 1 = nicht empfindlich  
3 = sehr empfindlich

A = in der Praxis bestätigt  
B = nicht gesichert

Autoren:  
Jean-Luc Tschabold, Andi Häseli, Franco Weibel